

CAROÇOS DE JABUTICABA DESENCADEANDO QUADRO DE SUBOCLUSÃO INTESTINAL

Cláudio Manuel G. Martins, Nelson Bittencourt do Nascimento*

A paciente teve um quadro de cólicas abdominais, distensão e massa palpável em fossa e flanco ilíacos direitos ao exame clínico.

Ao raio X simples de abdômen, distensão do delgado e do cólon direito até o ângulo esplênico.

O estudo tomográfico sem contraste mostrou inúmeras

imagens nodulares densas agrupadas no ceco, porém, espalhadas no intestino, que a paciente questionada, confessou ter ingerido grande quantidade de jabuticabas na véspera.

Ao analisar o ângulo esplênico do cólon foi encontrada lesão estenosante no descendente, compatível com processo neoplásico.



Radiografia simples mostrando distensão do delgado e do cólon direito



Cortes tomográficos helicoidais, ao nível da pelve e do flanco direito, mostrando caroços de jabuticaba no ceco e cólon ascendente

Rev. Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba, v. 8, n. 2, p. 31, 2006

* Médicos do Setor de Imagens do Hospital Miguel Villa Nova Soeiro - Unimed Sorocaba

Recebido em 19/5/2006. Aceito para publicação em 22/5/2006.